

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43

DLP 19-11-84454460

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

ÉDITION A ou B : 125 F

ÉDITION A + B : 225 F

BULLETIN N° 29 du 14 Novembre 1984

ÉDITION GRANDES CULTURES

Envoi n° 25

ATTENTION AUX PUCERONS SUR CÉREALES

CÉREALES

Jaunisse nanisante des céréales

Situation :

La poursuite du temps doux est **très favorable** aux vols et à la multiplication des pucerons.

Nos derniers comptages mettent en évidence des infestations variant de 5 à plus de 50 % de pieds porteurs de pucerons.

Les plus fortes populations sont observées dans :

- les semis précoces (avant le 15 octobre),
- les zones de bordure,
- les parcelles abritées.

Préconisations :

La décision de traitement ne peut se prendre qu'au niveau de chaque parcelle, après observation d'une cinquantaine de pieds.

Le rattrapage important souvent observé dans les cultures au printemps ne permet pas de fixer de seuil d'intervention précis.

Toutefois, des résultats d'essais ont montré que des pucerons demeurant 15 jours sur 10 à 15 % des pieds d'une parcelle peuvent provoquer des dégâts sérieux.

** Pour les semis précoces (stade 3 feuilles et plus) n'ayant reçu aucune protection à ce jour : intervenez dès que possible en cas de présence de pucerons sur 20 % des pieds environ.*

** Pour les semis précoces déjà protégés : une nouvelle "colonisation" des*

parcelles est possible, notamment en cas de maintien du temps doux.

Une nouvelle intervention pourrait alors être envisagée en cas de réinfestation sérieuse.

** Pour les semis plus tardifs (1 à 2 feuilles) : les populations sont généralement faibles. Sauf exception, attendez le stade 2 feuilles pour décider de toute intervention.*

En cas d'arrivée d'une période de gel marqué (-6 à -8°C) dans les tous prochains jours, les pucerons pourraient disparaître rapidement. Les interventions insecticides pourraient alors être limitées aux semis les plus précoces.

OBSERVEZ ET TRAITÉZ AUX HEURES LES PLUS CHAUDES.

COLZA

Charançon du bourgeon terminal

Des captures parfois importantes ont été enregistrées en début du mois dans les zones à risque (Aube, Ouest de la Haute-Marne, Vallée de Marne, secteur de Vitry le François et Tardenois).

Sur les parcelles arrivant en fin de protection (traitement en végétation remontant à plus de 15 jours - 3 semaines), l'intervention conseillée dans notre dernier bulletin est à réaliser rapidement si cela n'a pas été fait.

Nous vous rappelons que la lutte contre les adultes doit être la technique à privilégier, la destruction des larves étant plus aléatoire.

Imprimerie de la Circonscription Champagne-Ardenne. Le Directeur Gérant J. BOUCHET.

Commission Paritaire de la Presse N 529 AD

(C. SPV 1984) "Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation".

7102